

ลักษณะการทำลาย



หนอนเจาะดอกมะลิ เป็นแมลงศัตรูที่สำคัญที่สุดของมะลิ ตัวหนอนมีลำตัวขนาดเล็ก สีเขียว ปากหรือหัวมีสีดำ จะเข้าทำลายดอกมะลิตั้งแต่ระยะเป็นดอกตูมขนาดเล็ก ซึ่งเกษตรกรสามารถสังเกตลักษณะการเข้าทำลายของหนอนได้จากอาการของดอกมะลิเป็นรอยขีด จะมองเห็นมูลของหนอนเป็นขุยๆ ภายใต้ออก ดอกจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำตาลเหี่ยวแห้งและร่วงหล่น กรณีถ้าต้นมะลิไม่มีดอก หนอนจะเข้าทำลายกัดกินใบอ่อนหรือยอดอ่อน ถ้าหนอนระบาดหนักจะไม่มีดอกมะลิให้เหลือเก็บขายได้

หนอนชนิดนี้จะระบาดมากในฤดูฝน ทำให้ดอกเสียหายมาก โดยการเจาะกัดกินดอก ทำให้ดอกเป็นรูและผิดปกติรูปร่าง เมื่อนอนดูดอกกินน้ำเลี้ยงจากดอกจะทำให้กลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง หนอนเจาะดอกจะมีการระบาดมากกว่าแมลงตัวอื่นๆ หากป้องกันกำจัดไม่ทันจะเกิดความเสียหายมาก



การป้องกันกำจัด

- ทำความสะอาดบริเวณโคนต้นโดยการเก็บเศษพืชนำไปเผาทำลายเพื่อป้องกันการเข้าตักแด้ของหนอนเจาะดอก
- ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ง เพื่อไม่ให้เป็นที่อาศัยของตัวเต็มวัย
- วิธีป้องกันกำจัดที่ยูนิไลฟ์แนะนำ **ฟิฟเปอร์ 20-40 ซีซี** หรือ **ไซโปรออร์ 35 10-20 ซีซี** หรือ **ไฮ-นิว 20 30 ซีซี** ต่อน้ำ 20 ลิตร

กำจัดหนอนเจาะดอก



ยูนิไลฟ์ : ผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร